

# Föräldrainformation om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

## Ifylles och lämnas snarast till skolsköterskan

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinerna mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta. Det kombinerade vaccinet, ~~ARRVAGS~~ <sup>PRIVIX</sup>, ger trohigen ett livs-långt skydd mot alla sjukdomarna.

Vaccinering sker vid två tillfällen. Den första erhålls på barnavårdscentralen, när barnet är 1 1/2 år. Den andra ges i skolan i årskurs 6.

Mässling, påssjuka och röda hund kommer sannolikt att kunna utrotas i Sverige om minst 90 % av alla barn vaccinerats.

\* Heter numera *Privix*



## Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?

Mässling är ofta en besvärlig sjukdom med hög feber, hosta och långvarig trötthet. I enstaka fall tillståndet hjärninflammation, som kan ge bestående skador.

Påssjuka är den vanligaste orsaken till hjärninflammation hos barn. Den kan också ge bestående skador. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterkador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn – även pojkar – kan vi förhindra att gravida smittas med röda hund.

## Kan vaccinationen ge besvär?

Feber och utslag kan uppträda 1 till 2 veckor efter vaccinering. Några enstaka barn kan få lindrig ledvärk eller svullnad, som vid påssjuka. Alla dessa besvär är snabbl övergående och brukar försvinna eller ett par dagar. Barnen är inte smittsamma för andra.

Barn med feber ska inte vaccineras. En vanlig förkyllning utan feber är dock inget hinder för vaccination. Barn som fått vaccination mot tuberkulos eller gula febern bör inte vaccineras förrän viss tid förlutit. Gammaglobulin bör inte ges inom 2 veckor efter vaccination med ~~VARTAVAC~~ Om gammaglobulin redan givits bör man vänta 3 månader innan vaccination med ~~VARTAVAC~~ ges.

## Har eleven haft en eller flera av de tre sjukdomarna?

Det kombinerade vaccinet bör ges till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Detta därför att röda-hund-diagnosen ofta är felaktig, vilket även kan vara faller med diagnos av mässling och påssjuka. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar bör få det kombinerade vaccinet i 12-års-åldern.

Sverige har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. Vi är redan på god väg – mässling, påssjuka och röda hund är nu sällsynta.

Vi inom Skolhälsovården och på Smittskyddsinstitutet hoppas att Ditt barn ska ta vara på möjligheten att vaccineras. Den som är o vaccinerad riskerar att drabbas av sjukdomarna som vuxen, vilket ofta innebär att man får ett svårare sjukdomsförlopp.

November 1993

## Smittskyddsinstitutet och Skolhälsovården

Utarbetad i samarbete med Skolverket

## VACCINATIONSTILLSTÅND

Ivyllje och lämna s... rasi till s... köterskan

Tillstånd att mitt barn vaccineras med det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund

Ja  Nej

Om nej, ange varför

Datum

Förälders/Vårdradslävarares namnteckning

Skola

Personnummer

Skola

Klass

Har eleven fått gammaglobulin eller någon annan vaccination under de tre senaste månaderna

Ja  Nej

Har eleven svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinerig

Ja  Nej

Om ja, ange vad

Har eleven före åk 6 fått vaccin mot

Mässling  Ja  Nej

Röda hund  Ja  Nej

Påssjuka  Ja  Nej

Har eleven haft

Mässling  Ja  Nej

Röda hund  Ja  Nej

Påssjuka  Ja  Nej

Ta kontakt med skolsköterskan eller skolläkaren om Ditt barn har någon allvarlig och/eller långvarig sjukdom, svår allergi eller om Du har några frågor.

Skolsköterska *Lia Lejtemo*

Telefon *508 2705* Telefonid